核准日期：2021年04月30日
修改日期：2025年10月01日

凝血因子Ⅷ说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

原料来自人血，虽然对原料血浆进行了相关病原体的筛查，并在生产工艺中加入了灭活病毒的措施，

200IU

【本品成分】本品临床试验中一60例血友病患者中，共72例受试者发生72例次不良反应，不良反应发生率为7.5%。

【适应症】用于治疗血友病甲（先天性凝血因子Ⅷ缺乏）。

【不良反应】发热、寒战、皮疹、荨麻疹、恶心、呕吐、食欲减退、腹泻、便秘、胃肠不适、腹痛、消化不良、头痛、头晕、血管扩张、颜面潮红、高血压、心悸、胸闷、气短、咳嗽、鼻出血、鼻塞、鼻干、鼻炎、咽喉刺激、口干、口唇干燥、口唇发绀、口唇水肿、口唇红斑、口唇皲裂、口唇溃疡、口唇糜烂、口唇出血、口唇结痂、口唇脱屑、口唇瘙痒、口唇疼痛、口唇麻木、口唇感觉异常、口唇感觉减退、口唇感觉过敏、口唇感觉迟钝、口唇感觉消失、口唇感觉丧失、口唇感觉缺失、口唇感觉障碍